


鯪

科学出版社 (Science Press): 《中国内陆鱼类物种与分布》 (Species Diversity and Distribution of Inland Fishes in China), 2016.01., No.1, ISBN 978-7-03-047210-6, P. 56



外分布于俄罗斯、朝鲜半岛、越南等。

39. *Tinca* Cuvier, 1816 丁鲃属

Tinca Cuvier, 1816, 193。

(88) *Tinca tinca* (Linnaeus, 1758) 丁鲃

Cyprinus tinca Linnaeus, 1758, 321。

Tinca tinca: Berg, 1949, 614; 杨干荣和黄宏金(见伍献文等), 1964, 11; 马桂珍(中国科学院动物研究所等), 1979, 22; 罗云林(见陈宜瑜等), 1998, 93-95。

分布: 新疆额尔齐斯河及乌伦古河; 国内多地已有养殖。国外分布于欧洲。

40. *Tribolodon* Sauvage, 1883 三块鱼属

Tribolodon Sauvage, 1883, 149。

(89) *Tribolodon brandti* (Dybowski, 1872) 三块鱼

Telestes brandti Dybowski, 1872, 215。

Leuciscus brandti: 宫地传三郎, 1940, 41; 杨干荣和黄宏金(见伍献文等), 1964, 29; 郑葆珊等, 1980, 60。

Tribolodon brandti: Chu, 1935, 120; 罗云林(见陈宜瑜等), 1998, 74-75。

别名: 滩头雅罗鱼、滩头鱼。

分布: 洄游性种类, 由河口咸淡水区进入河流繁殖; 图们江和黑龙江水系。国外分布于俄罗斯阿穆尔河及图们江等流域、日本和朝鲜。

(90) *Tribolodon hakonensis* (Günther, 1877) 珠星三块鱼

Leuciscus hakonensis Günther, 1877, 442。

Tribolodon hakonensis: Okada, 1961, 482; 郑葆珊等, 1980, 63; 罗云林(见陈宜瑜等), 1998, 73-74; 董崇智等, 2001, 98。

别名: 珠星雅罗鱼。

分布: 洄游性种类, 由河口咸淡水区进入河流繁殖; 图们江和绥芬河。国外分布于日本、朝鲜和俄罗斯。

(3) Cultrinae 鲃亚科

41. *Anabailius* Cockerell, 1923 白鱼属

Anabailius Cockerell, 1923, 531。

Nicholsiculus Rendahl, 1928, 118。

Rohanus Chu, 1935, 40。

(91) *Anabailius alburnops* (Regan, 1914) 银白鱼

Barilius alburnops Regan, 1914, 260。

Ischikauia grahami: Nichols, 1943, 140。

Anabailius alburnops: Chu, 1935, 4; 易伯鲁和吴

清江(见伍献文等), 1964, 73; 陈银瑞, 1986, 434;

陈银瑞(见褚新洛和陈银瑞), 1989, 74; 罗云林和陈银瑞(见陈宜瑜等), 1998, 140-141。

保护等级: 《中国濒危动物红皮书-鱼类》(濒危)。

分布: 云南滇池。

(92) *Anabailius andersoni* (Regan, 1904) 星云白鱼

Barilius andersoni Regan, 1904a, 416。

Ischikauia andersoni: 张春霖, 1959, 101。

Anabailius andersoni: Chu, 1935, 4; 易伯鲁和吴清江(见伍献文等), 1964, 74; 陈银瑞, 1986, 433; 陈银瑞(见褚新洛和陈银瑞), 1989, 69; 罗云林和陈银瑞(见陈宜瑜等), 1998, 135-136。

Anabailius andersoni andersoni: 陈银瑞和褚新洛, 1980, 418。

分布: 云南星云湖。

(93) *Anabailius brevianalis* Zhou et Cui, 1992 短臀白鱼

Anabailius brevianalis Zhou et Cui(周伟和崔桂华), 1992, 49。

分布: 四川省会东县金沙江支流鲮鱼河。

(94) *Anabailius duoyiheensis* Li, Mao et Lu, 2002 多衣河白鱼

Anabailius duoyiheensis Li, Mao et Lu(李维贤, 卯卫宁, 卢宗民), 2002, 1。

分布: 南盘江支流。

(95) *Anabailius goldenlineus* Li et Chen, 1995 路南金线白鱼

Anabailius goldenlineus Li et Chen(李维贤和陈爱玲), 1995, 80。

分布: 云南南盘江支流的巴江、黑龙潭水库。

(96) *Anabailius grahami* (Regan, 1908) 鳊白鱼

Barilius grahami Regan, 1908a, 357。

Ischikauia grahami: Nichols, 1943, 140。

Anabailius grahami: Chu, 1935, 4; 易伯鲁和吴清江(见伍献文等), 1964, 74; 陈银瑞, 1986, 433; 陈银瑞(见褚新洛和陈银瑞), 1989, 67; 罗云林和陈银瑞(见陈宜瑜等), 1998, 134-135。

分布: 云南抚仙湖。

(97) *Anabailius liui chenghaiensis* He, 1984 程海白鱼

Anabailius liui chenghaiensis He(何纪昌), 1984, 105。

Anabailius liui: 陈银瑞和褚新洛, 1980, 418; 陈银瑞(见褚新洛和陈银瑞), 1989, 62。